

## ＜園児のかかりやすい伝染病＞

病名	主な症状	潜伏期間	出席停止期間
麻疹（はしか）	発熱、咳、くしゃみ、 結膜炎、発疹がでる	10～13日	解熱後3日経過するまで
水疱 （みずぼうそう）	発熱とともに水疱のある 発疹がでる	10～21日	すべての発疹が消失する まで
風しん （三日はしか）	軽い風邪症状、発熱と共に 発疹がでる	14～21日	発疹が消失するまで
流行性耳下腺炎 （おたふくかぜ）	発熱、耳の下が腫れる	14～21日	耳下腺の腫れが消え全身状態 が良好になるまで
インフルエンザ	発熱、咳、のどの痛み 関節の痛みがある、頭痛 嘔吐、下痢	1～3日	発症後5日かつ解熱3日を経過 するまで
百日咳	特有の咳（コンコン、 ヒューヒュー）が夜中に 続く	6～20日	特有の咳が消えるまで
溶連菌感染症	発熱、発疹、いちご舌、 のどが痛く赤みがある	1～7日	抗菌薬服用後24～48時間経 過後
咽頭結膜炎 （プール熱）	発熱、のどが赤くなる 目の充血、目やにがでる	5～6日	主要症状が消えてから2日後
流行性耳下腺炎	目が急に赤くなり、まぶた が腫れて、目やにがでる	1週間以上	主要症状が消えるまで
乳幼児嘔吐下痢症	激しい嘔吐と下痢 風邪のような症状を伴う	1～3日	主要症状が消えるまで

病名	主な症状	潜伏期間	出席停止期間
手足口病	手のひら、足の裏、口の中に米粒大の水疱ができる	2～7日	普通に食事接種ができ機嫌が良い。伝染することも考えられるため医師の診断を要する
伝染症紅斑 (りんご病)	ほっぺがりんごの様に赤くなる。手、足、お尻に発疹ができる	17～18日	
伝染症膿痂疹 (とびひ)	虫刺されなどを掻き壊して細菌がつき、水疱ができて広がる	2～10日	
伝染性軟属腫 (水いぼ)	ピンクまたは白の小さな丘疹で中央にくぼみがある	14～50日	伝染することも考えられるため、医師の診断を要する
突発性発疹	突然高熱が3～4日続き、熱が下がると同時に、全身に発疹がでる(生後6か月～1歳位まで)	約10日間	
疥癬(かいせん)	赤い小さなぼつぼつが身体、腕、脚などに見られ、痒みを伴う	2週間～6週間	