

<園児のかかりやすい感染症>

病名	主な症状	潜伏期間	出席停止期間
麻疹(はしか)	発熱、咳、くしゃみ、結膜炎、発疹が出る	10～13日	解熱後3日経過するまで
水泡(みずぼうそう)	発熱とともに水泡のある発疹が出る	10～21日	すべての発疹が消失するまで
風疹(三日はしか)	軽い風邪症状、発熱とともに発疹が出る	14～21日	発疹が消失するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	発熱、耳の下がはれる	14～21日	耳下腺の腫れが消え全身状態が良好になるまで
インフルエンザ	発熱、咳、のどの痛み、関節の痛みがある 頭痛 嘔吐 下痢	1～3日	発症後5日かつ解熱の3日を経過するまで
百日咳	特有の咳(コンコン、ヒューヒュー)が夜中に続く	6～20日	特有の咳が消えるまで
溶連菌感染症	発熱、発疹、いちご舌、のどが赤く痛みがある	1～7日	抗菌薬服後 24～48時間経過後
咽頭結膜炎(プール熱)	発熱、のどが赤くなり、目の充血、目やが出る	5～6日	主要症状が消えてから2日後
流行性角結膜炎	目が急に赤くなり、まぶたが腫れて目やが出る	1週間以上	主要症状が消えるまで
乳幼児嘔吐下痢症	激しい嘔吐と下痢、風邪のような症状を伴う	1～3日	主要症状が消えるまで